

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NAM  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 321/KSBT-PCBTN

Quảng Nam, ngày 26 tháng 5 năm 2022

V/v tăng cường công tác tiêm chủng  
vắc xin phòng COVID-19 và rà soát  
người tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Kính gửi: Trung tâm Y tế 18 huyện, thị xã, thành phố.

*Căn cứ Công điện số 702/CĐ-BYT ngày 24/5/2022 của Bộ Y tế về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;*

*Căn cứ Công văn số 2357/BYT-DP ngày 09/05/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4);*

*Căn cứ Công văn số 3320/UBND-KGVX ngày 25/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;*

*Căn cứ Công văn số 1133/SYT-NVY ngày 18/05/2022 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và rà soát đối tượng tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).*

Để tăng cường miễn dịch phòng chống bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đề nghị Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục khẩn trương đẩy mạnh triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lần 1 (mũi 3) cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo hoàn thành trong quý II/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022.

2. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong quý II/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ.

3. Rà soát đối tượng để triển khai tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng COVID-19:

- Đối tượng tiêm: Người từ 50 tuổi trở lên; Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp;

- Vắc xin sử dụng: vắc xin mRNA (vắc xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất); vắc xin do Astrazeneca sản xuất; vắc xin cùng loại với vắc xin đã tiêm mũi 3 (mũi nhắc lần 1);

- Khoảng cách: Ít nhất là 4 tháng sau mũi nhắc lần 1;



- Người đã mắc COVID-19 sau khi tiêm mũi 3: trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Y tế (để báo cáo);
- BGĐ TTCSBT (để báo cáo);
- Khoa TTGDSC (để phối hợp);
- Lưu: VT, PCBTN.



GIÁM ĐỐC  
KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Công Quang

